DIAGNÓSTICO TARDIO DE TUMOR TESTICULAR COM DISSEMINAÇÃO METASTÁTICA EM FÍGADO E PULMÃO: RELATO DE CASO

William Robson Marques Júnior
Layandra Vittoria de Assis
Lucas Campos Lopes
Gabriel Saliba Laguna
Matheus Sérgio Sebastião
José Silveira dos Reis Júnior
Aiala Xavier Felipe da Cruz

Introdução: o tumor de testículo, apesar de raro, é mais incidente em homens na idade reprodutiva, entre 15 e 50 anos. Pode cursar com orquiepididimite, aumento testicular, hematúria, e dor na região infra abdominal, quadros que podem trazer confusão e retardo no diagnóstico. Com isso, o objetivo deste relato é apresentar um caso de tumor testicular em fase avançada, já metastático, e discutir a respeito do tratamento e a importância do diagnóstico precoce da doença. **Relato de Caso:** paciente do sexo masculino, 32 anos, admitido em Unidade de Pronto Atendimento com quadro de adinamia, fraqueza, astenia, cansaço aos esforços e febre, há 21 dias. Paciente apresentava tumefação testicular com 02 anos de progressão, em acompanhamento irregular na rede privada de saúde. Trouxe consigo ultrassonografia testicular realizada a 2 anos atrás, com laudo de orquiepididimite em testículo direito. Na internação, foi solicitado tomografia computadorizada de tórax e abdome, que revelou múltiplos nódulos pulmonares e áreas hipodensas mal delimitadas em fígado sugerindo lesões secundárias à patologia neoplásica primária de sítio indeterminado. Aos exames laboratoriais, exames negativos para BAAR, LDH de 5.280 e beta HCG positivo, o que colaborou para o diagnóstico de neoplasia testicular maligna com disseminação a distância. À oncologia, o paciente obteve parecer de portador de doença grave com potencial cura, sendo encaminhado para centro oncológico de referência mais próximo. **Conclusão:** quando diagnosticado precocemente, o tumor testicular possui bom prognóstico e baixo índice de mortalidade. O US da bolsa escrotal e dosagem de marcadores séricos são parte do diagnóstico. O tratamento é cirúrgico, seguido de radioterapia, quimioterapia e controle clínico. Assim, é importante reconhecer as manifestações iniciais e garantir o cuidado precoce do paciente para evolução favorável.

Palavras-Chave: Tumor. Testículo. Metástase. Orquiepididimite.