

OCORRÊNCIA DE CASOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL E TEGUMENTAR AMERICANA EM IPATINGA DE 2007 A 2022

Barbara Martins Mello de Oliveira
Márcio de Castro
Ana Carolina Vale Campos Lisboa

Introdução: a leishmaniose é causada por protozoários do gênero *Leishmania*, subdividindo-se em visceral (LV), que acomete órgãos internos e tegumentar americana (LTA) com envolvimento de pele e mucosas. Sua transmissão ocorre ao homem por insetos vetores, flebotomíneos. A LV relaciona-se aos animais domésticos e a LTA aos silvestres. **Objetivo:** avaliar a incidência de leishmaniose visceral e tegumentar americana na cidade de Ipatinga entre os anos de 2007 e 2022. **Método:** trata-se de um estudo retrospectivo, quantitativo e descritivo, com dados obtidos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), referente aos anos de 2007 a 2022. Foram avaliados faixa etária, classificação clínica e evolução. **Resultados:** de 2007 a 31 de janeiro de 2022 foram confirmados 252 casos de leishmaniose visceral (LV) em Ipatinga. As maiores taxas de incidência nesse período foram em 2014 e 2015, totalizando 51 casos. Em 2015, ocorreu a maior incidência de letalidade (8 casos), 4,2% dos confirmados. Em relação à faixa etária, os dois grupos com maior risco foram entre 1 e 4 anos (145 notificações) e superior aos 65 anos (162). Já a tegumentar americana (LTA), foi diagnosticada em 540 pacientes nesse mesmo período, com apenas dois óbitos em 2009 e 2017. A forma clínica cutânea estava presente em 88,5% (478) e a mucosa em 11,5% (62). Em números absolutos, o maior aumento da incidência dessa patologia foi em 2020, com 29 casos, para o ano de 2021, com 77. Como na LV, indivíduos acima de 65 anos foram mais acometidos. **Conclusão:** trata-se de uma região endêmica para ambas LTA e LV. O combate dessa enfermidade é um grande desafio pois envolvem reservatórios silvestres e domésticos, respectivamente. Tratar de uma doença de curso de infecção cíclica é preciso observar os índices epidemiológicos para traçar estratégias de controle em ambos os tipos de leishmaniose.

Palavras-chave: Leishmaniose. Leishmaniose visceral. Leishmaniose Tegumentar Americana.